

# Enoxin™ Vet Solution

Enrofloxacin 100 mg/ml

## Presentation

Enoxin™ Vet Solution: Each ml solution contains Enrofloxacin BP 100 mg.

## Descriptions

Enrofloxacin is a dependable bactericidal and mycoplasmaicidal antibiotic. Enrofloxacin is an antibiotic of quinolones group that inhibits the activity of bacterial DNA-gyrase enzyme, resulting disruption of bacterial DNA replication and bacteria dies.

## Indications

Enoxin™ Vet Solution is very effective against various gram positive and gram negative bacteria, *Mycoplasma*, *Staphylococci*, *Streptococci*, *E. coli*, *Salmonella*, *Hemophilus*, *Klebsiella*, *Pasteruella* and *Bronchoseptica*.

## Dosages and administration

**Treatment:** 1 ml/2 liter of drinking water or 10 mg/kg body weight for 3-5 days.

Or as Directed by the registered Veterinarian.

## Side Effects

Enrofloxacin is well tolerated at recommended dose. However, it may cause cartilage abnormalities in young chicks.

## Precautions

After the end of treatment, the watering system should be cleaned appropriately to prevent taking rest drug which may lead to resistance.

## Contraindications

Hypersensitive to its any active ingredients. It Should not be used with Chloramphenicol, Macrolide and Tetracycline.

## Pregnancy and Lactation period usages

Should not be used in layer within 14 days of going to lay.

## Drug Interaction

Magnesium and Aluminium containing substances may hamper the absorption of Enrofloxacin.

## Overdose

In cases of excessive overdose, transient reduction of mobility and cramps may occur.

## Withdrawal Period

Meat : 4 days,

Egg : 7 days.

## Storage

Do not store above 30 °C temperature, avoid freezing. Keep away from light and out of the reach of children.

## Commercial Packaging

Enoxin™ Vet Solution 100 ml : Each H.D.P.E. bottle contains 100 ml solution.

Enoxin™ Vet Solution 500 ml : Each H.D.P.E. bottle contains 500 ml solution.

Enoxin™ Vet Solution 1 Liter : Each H.D.P.E. bottle contains 1 Liter solution.

**For Veterinary Use Only**

Manufactured by

 **Incepta Pharmaceuticals Ltd**

Animal Health Division

Dhamrai, Dhaka, Bangladesh

TM Trademark

EF2

V.N. 01

# এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন

এনরোফ্লক্সাসিন ১০০ মি.গ্রা./মি.লি.

## উপস্থাপনা

এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন: প্রতি মি.লি. সলিউশন-এ রয়েছে এনরোফ্লক্সাসিন বিপি ১০০ মি.গ্রা.।

## বিবরণ

এনরোফ্লক্সাসিন একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাক্টেরিওসাইডাল ও মাইকোপ্লাজমসাইডাল এন্টিবায়োটিক। এনরোফ্লক্সাসিন কুইনোলন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক যা ব্যাক্টেরিয়ার ডি.এন.এ.-গাইরেজ এনজাইমকে প্রতিহত করে, ফলে ব্যাক্টেরিয়ার দেহে ডি.এন.এ. রিপলিকেশন বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাক্টেরিয়া মারা যায়।

## ব্যবহারক্ষেত্র

এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন পোষ্ট্রি বিভিন্ন গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, স্টেফাইলোকক্কাই, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ই-কলাই, সালমোনেলা, হিমোফিলাস, ক্লেবশিয়েলা, পাস্টুরেলা, ব্রুসেল্লা ডিগ্রাম এবং ব্রুক্সিসেপ্টিকা- এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর।

## মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

চিকিৎসায়: ১ মি.লি./২ লিটার পানিতে অথবা ১০ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজনে ৩-৫ দিন।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিগারিয়ান-এর পরামর্শ অনুযায়ী।

## পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

এনরোফ্লক্সাসিন অনুমোদিত মাত্রায় সুসহনীয়। তবে, অল্প বয়স্ক মুরগীতে তরুণস্থির অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

## সতর্কতা

চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর, ব্যবহারের পর অবশিষ্ট ঔষধের রেজিস্ট্রাস প্রতিরোধ পানি ব্যবস্থাপনা যথাযথ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

## প্রতি নির্দেশনা

এটির যে কোন কার্যকর উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতায়। এটি ক্লোরামফেনিকল, ম্যাফ্রোলিড ও ট্রেট্রাসাইক্লিন-এর সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

## গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

লেয়ারে ডিম দেয়ার ১৪ দিনের আগে থেকে ব্যবহার করা উচিত নয়।

## ড্রাগ-ইন্টারাকশন

ম্যাগনেসিয়াম ও এলুমিনিয়াম ধারণকারী বস্তু পরিপাকনালী হতে এনরোফ্লক্সাসিন শোষণ ব্যহত করতে পারে।

## মাত্রাধিক্য

অধিক মাত্রাধিক্যের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ক্ষণস্থায়ী কমানো এবং খিঁচনী হতে পারে।

## প্রত্যাহার কাল

মাংস : ৪ দিন,

ডিম : ৭ দিন।

## সংরক্ষণ

৩০ °সে. তাপমাত্রার উপরে সংরক্ষণ করা যাবে না, হিমায়িত করা যাবে না। আলো থেকে দূরে ও শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## বাপিজ্যিক মোড়ক

এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন ১০০ মি.লি.: প্রতিটি এইচ.ডি.পি.ই. বোতলে রয়েছে ১০০ মি.লি. সলিউশন।

এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন ৫০০ মি.লি.: প্রতিটি এইচ.ডি.পি.ই. বোতলে রয়েছে ৫০০ মি.লি. সলিউশন।

এনোক্সিন™ ভেট সলিউশন ১ লিটার: প্রতিটি এইচ.ডি.পি.ই. বোতলে রয়েছে ১ লিটার সলিউশন।

কেবলমাত্র প্রাণী চিকিৎসায় ব্যবহার্য

প্রস্তুতকারক

 **ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**

এনিমেল হেলথ ডিভিশন

ধামরাই, ঢাকা, বাংলাদেশ

TM ট্রেডমার্ক