

W=130 mm, L=200 (8X25) mm

8 mm

25 mm

## Clopramin™

Clopramin Hydrochloride 25 mg

### Presentation

Clopramin™ Tablet: Each tablet contains Clopramin Hydrochloride USP 25 mg.

### Description

Clopramin Hydrochloride is an original tricyclic antidepressant, a member of the dibenzazepine group of compounds. It is presumed to influence obsessive and compulsive behaviors through its effects on serotonergic neuronal transmission. The actual neurochemical mechanism is unknown but it has the capacity to inhibit the reuptake of serotonin (5-HT) which is thought to be important (like obsessions, compulsion) thus hampers social acquaintance.

### Indication

Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Major Depressive Disorder (MDD), Depression

### Dosage and Administration

Initial dose is 25 mg at bed time about a week, gradual increase of dose should not be exceeded more than 150 mg per day in adult and 75 mg per day in elderly patient. Dose can be given as divided form to reduce gastrointestinal disturbances.

Not recommended for children.

### Side effects

The most frequent side effects are gastrointestinal disturbances, Headache, dizziness, nausea, constipation, dry mouth, increased sweating, shaking hands, tremor, difficulty in passing urine, problems with their eyes, feeling tired or sleepy, sexual disturbance, restlessness.

### Contraindications

- Patients who have shown hypersensitivity to Clopramin Hydrochloride or hypersensitivity to other tricyclic antidepressants belonging to the dibenzazepine group
- Patient with acute recovery phase following a myocardial infarction
- Should not be used in with MAO (Monoamine Oxidase) inhibitors within 14 days

### Warning & Precaution

Talk to your doctor or pharmacist before taking Clopramin if you:

- have ever had suicidal thoughts
- suffer from epilepsy (fits)
- have had a head injury or have suffered brain damage
- are going to have electric shock therapy (ECT)
- have other problems with your heart
- have been told you have a low level of potassium in your blood (hypokalaemia).

The doctor will need to treat this before you start taking clopramin

- have kidney disease
- suffer from schizophrenia or other mental health conditions
- have a blood disorder
- have an overactive thyroid gland
- have had severe constipation for a long time
- have a tumour (cancer) of the adrenal gland (such as pheochromocytoma or neuroblastoma)
- liver disease
- have low blood pressure
- wear contact lenses

### Use in Pregnancy & Lactation

No adequate well-controlled studies of safety for pregnancy. Limited data suggest that clopramin is likely to be excreted in human breast milk. Although it has known risk of damage to fetus.

### Drug Interaction

medicines for depression, particularly MAOIs (see section "Do not take" above) e.g. tranylcypromine, phenelzine, moclobemide; SSRIs e.g. fluoxetine (or have taken within the last 3 weeks), fluvoxamine, paroxetine, sertraline; SNaRIs e.g. venlafaxine; tricyclic and tetracyclic antidepressants e.g. amitriptyline, dothiepin, maprotiline

- diuretics, also known as 'water tablets', e.g. bendroflumethiazide, furosemide
- anaesthetics, used for the temporary loss of bodily sensation
- Blood pressure lowering agents (Beta blockers), Anti-coagulants etc.

### Overdose

It has been reported that adults can experience dryness of mouth, dilated pupils, coma, convulsions. Tachycardia/ cardiac arrhythmia, respiratory depression and alteration in blood pressure are noted.

### Storage

Do not store above 30 ° C. Keep away from light and out of the reach of children.

### Commercial Pack

Clopramin™ Tablet: Each box contains 3 blister strips of 10 Tablets.

Manufactured by  
**Incepta Pharmaceuticals Ltd**  
Savar, Dhaka, Bangladesh  
™ Trademark

VN.01  
CPN

## ক্লোপ্রামিন™

ক্লোপ্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড ২৫ মি.গ্রা.

### উপস্থাপন

ক্লোপ্রামিন™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে ক্লোপ্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ২৫ মি.গ্রা.।

### বর্ণনা

ক্লোপ্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড হচ্ছে মৌলিক ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট, যা কিনা ডাইবেনজোজেপাইন গ্রুপের একটি সদস্য। ক্লোপ্রামিনের কার্যসাপন পদ্ধতি স্পষ্ট নয়। অবশ্যই কমালাপিত ডিসঅর্ডার, মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, আবেগ এবং ফোকিয়াজনির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়, এটি এই অবস্থার প্রতিটি লক্ষণ সহজ করতে সাহায্য করতে পারে। এটা মস্তিষ্ক রাসায়নিক সেরোটোনিন এর সঙ্গে হস্তক্ষেপ ঘরা কাজ করে।

### নির্দেশনা

অবশ্যই কমপালিসড ডিসঅর্ডার, মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেসন।

### সেবনমাাত্রা ও বিধি

সর্বোচ্চ ২৫ মি.গ্রা. ডোজে ঘুমানোর সময় সেবন শুরু করতে হবে, ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যাবে (বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭৫ মি.গ্রা পর্যন্ত দেয়া যাবে)।

শিশুদের ডিপ্রেসনের জন্য প্রযোজ্য নয়।

### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

প্রায়শ সংঘটিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হলো অস্ত্রের উপসম, ড্রাই মাউথ, কোষ্টকাটিনা, ইউরিনারী রিটেনশন, বর্ধিত হৃদস্পন্দন, নিদ্রা"হীনত্ববতা, ইরিটেবিলিটি, মাথা ঘোরা,,হাসকৃত সমন্বয় সাধন। ড্রাই মাউথ যদি এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যাতে কথা বলা বা চোক গোলা কঠিনা হয় তবে ওষুধের ডোজ কমানো বা সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি এবং হ্রাস উভয়ই ক্লোপ্রামিন ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। হার্ট এ্যাটাক, কন্সট্রিক্টিভ হার্টফেইলর এবং স্ট্রোক হতে পারে। স্বল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে ক্লোপ্রামিন ব্যবহারে নিম্নবলিখিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো দেখা দেয় - বিধাবিবর্তিত, ডিজঅরিয়েন্টেশন, ডিলিউশন, ঘুমহীনতা এবং অস্থিরতা। ডুকসংক্রান্ত সমন্বয়বলী (অসংবেদনশীলতা, অবশ বা টিওলিং, চামড়ার ছোট ছোট লালা ফুসকুড়ি, চুলকানি এবং পাইটিসেস), কাঁপুনি এবং কানে জোঁ জোঁ শব্দ শোনা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। যদি যদি ডাব, ফুধামন্দা, ডায়রিয়া এবং পেটে বাথা ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব কম সংখ্যক ক্লোপ্রামিন ব্যবহারকারীদের মধ্যে দেখা দেয়।

### প্রতিনির্দেশনা

এম.এ.ও ইনহিবিটরের সাথে একত্রে বা এর দ্বারা ১৪ দিন চিকিৎসার মধ্যে ক্লোপ্রামিন দেয়া যাবে না। যদি এক সাথে দেয়া হয় তবে ওষুধ ইন্টারাকশনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ-জনিত বিপর্দয়, হাইপারএকটিভিটি, হাইপারেসিয়া, মালপেশীর বিচলি, মারাত্মক কাঁপুনি বা কোমা এমনকি মৃত্যুও সংঘটিত হতে পারে। যে সকল রোগী মারাত্মক কিডনী বা হেপাটিক রোগ রয়েছে এবং যাদের রক্ত ডিসক্রেসিয়াস রয়েছে তাদের জন্য ক্লোপ্রামিন প্রতিনির্দেশিত। ক্লোপ্রামিন প্রতিনির্দেশিত সেই সকল রোগীর জন্য যাদের ক্লোপ্রামিন হাইপারসেনসিটিভিটি রয়েছে বা ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট গ্রুপের অন্তর্গত ডাইবেনজোজেপাইন গ্রুপের ওষুধের হাইপারসেনসিটিভিটি রয়েছে। থুকোমা বা কাঁপুনি জনিত জটিলতা থাকলে দেয়া যাবে না।

### সাধনানভা

ক্লোপ্রামিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন এবং ডাক্তারদের তত্ত্বাবধান আবশ্যিক বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের বি পি এইচ, ইউরিনারী রিটেনশন এবং থুকোমা রয়েছে বিশেষ করে এ্যান্ডেল ক্রোসার থুকোমা। ইমিগ্রামিনের সিডেটিভ এক্শে বৃদ্ধি পায় যদি এর সাথে অন্যান্য সি.এন.এস ডিপ্রেসেন্টস দেয়া হয় যেমন: এ্যান্ডেল সমৃদ্ধ পানীয়, ঘুমের ওষুধ, অন্যান্য সিডেটিভ বা এন্টিহিস্টামিনস। ইমিগ্রামিন হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি বা হার্টের উপর চাপ ফেলেতে পারে। ক্লোপ্রামিন বা একই গ্রুপের অন্যান্য এন্টিডিপ্রেসেন্টস ব্যবহার কর্তিওভাসকুলার ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিপদজনক বিশেষ করে যাদের সংশ্লিষ্ট হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। বয়স্ক বা যে সকল রোগীর হার্ট ডিজিজ রয়েছে তাদের কন্সট্রিক্টিভ হার্ট ফেইলিওর, অর্থাভাবিক হৃদস্পন্দন এবং স্ট্রোক হতে পারে। রোগীদের খেপাশিউটিক ডোজ নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত আত্মহত্যার লক্ষণ আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করতে হবে। ক্লোপ্রামিন মাত্রাধিক বা এ্যান্ডেলের সাথে ব্যবহারে আত্মহত্যার ঝুঁকিতা বৃদ্ধি পায়। ক্লোপ্রামিন ব্যবহার শুরু করা হলে ম্যানিক এপিডোড বা পূর্বে বিনামান সাইকোটিক স্টেইটের লক্ষণের আবির্ভাব হতে পারে।

### গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহলে অবিলম্বে ওষুধ বন্ধ করুন। ফের চানু করার আগে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। যে সব মারেরা শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁরা ক্লোপ্রামিন খাওয়ার পর মারাত্মক সমস্যায় পড়তে পারেন।

### ড্রাগ ইন্টারাকশন

মিথাইলফেনিডেইট ক্লোপ্রামিনের প্রভাবকে বৃদ্ধি করে। ক্লোপ্রামিনের ডোজ কমানোর মাধ্যমে এর থেকে পরিষ্কার পাওয়া সম্ভব। ক্লোপ্রামিন এ্যান্ডেলের ডিপ্রেসেন্ট এ্যাকশন বৃদ্ধি করে। এম.এ.ও, ইনহিবিটরের সাথে একত্রে ব্যবহারে মারাত্মক উচ্চরক্তচাপ দেখা দেয়। মেসকল রোগী এম.এ ও ইনহিবিটর গ্রহণ করেন যেমন- ফেনোজিন সালফেট বা ট্রানিসাইগ্রামিন সালফেট তাদের ক্লোপ্রামিন ব্যবহারের কমপক্ষে ১৪ দিন আগ থেকে এম.এ.ও, ইনহিবিটর বন্ধ রাখতে হবে। এম.এ.ও, ইনহিবিটর শুরু করার সময়ও একই জাবে ক্লোপ্রামিন বন্ধ করতে হবে। এন্টিকোলিনার্জিক ড্রাগসমূহ যেমন- স্কলট্রাপিন, বিপারিডেম, ট্রাইফেইথেনিডাইল বা এন্টিহিস্টামিন ক্লোপ্রামিনের এন্টিকোলিনার্জিক প্রভাব বৃদ্ধি করে।

### সংরক্ষণ

৩০ °সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

### বাণিজ্যিক মোড়ক

ক্লোপ্রামিন™ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ৩টি ব্লিষ্টার স্ট্রীপ।

প্রস্তুতকারক  
**Incepta**  
**ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**  
সাতার, ঢাকা, বাংলাদেশ  
™ ট্রেডমার্ক।